

RODEO DE CRÍA BRAFORD

Oscar Pittaluga
Juan Manuel Soares de Lima

Como en años anteriores recordamos que en esta Unidad Experimental se han ido ajustando un conjunto de prácticas de manejo para las categorías que integran el rodeo de cría: terneros, vaquillonas de reposición y vacas de cría. Estas prácticas consideran manejo de la condición corporal, diferimiento de forraje, utilización de pasturas mejoradas, pastoreo por hora en las mismas, suplementación y destetes temporario y precoz.

Considerando los resultados obtenidos el año anterior, donde hubo una menor tasa de procreos, resultado de la aplicación de un paquete forrajero de menores costos, se han implementado otras medidas de manejo.


Los resultados que se presentan pertenecen al rodeo de la Unidad, constituido por 290 vacas de cría y sus correspondientes reemplazos, que se maneja en un área de 500 hás., la que se encuentra mejorada en un 10% de mejoramientos de diferentes edades. Debe destacarse la eliminación de verdes anuales del esquema, lo que si bien dificulta en algo el manejo, disminuye significativamente los costos forrajeros.

El sistema productivo es exclusivo de cría, con salida de terneros machos y vacas de descarte en el otoño, a efectos de disminuir la carga para el período invernal.

Terneros

La evolución de peso de estos lotes se presenta en la figura 1.

Figura 1. Evolución de peso de terneros




Los terneros que permanecieron al pie de la madre son sólo los hijos de vacas multíparas, mientras que los de vacas de primer cría fueron destetados precozmente entre fines de diciembre y principios de enero.

Se observan buenas ganancias de peso de los terneros al pie de la madre y una ganancia también buena, aunque ligeramente menor en los terneros destetados precozmente.

Vaquillonas de reposición


La evolución de peso y condición corporal de las terneras entre el destete y el año y medio de edad se observa en la figura 2.



A pesar de comenzar su desarrollo a partir de menores pesos de destete que en años anteriores y haber registrado bajas ganancias durante el período invernal, el buen crecimiento primavera estival permitió llegar al otoño con pesos razonables. Con estos pesos y un seguimiento en el próximo periodo es posible obtener los pesos y condición corporal requeridos para un entore temprano a los dos años.

Vaquillonas entoradas

La evolución realizada por las vaquillonas entoradas se muestran en la figura 3.




Se comprueba una buena evolución de peso y condición corporal de las vaquillonas entoradas aunque algo por debajo de lo registrado en años anteriores.

Con ganancias moderadas de peso será posible llegar al primer parto con buen peso y condición corporal.

Si bien la preñez lograda fue aceptable, se encuentra por debajo de lo esperable para esta categoría y destaca la necesidad de llegar con buenos pesos al inicio del entore.

Vacas de primer cría


Considerando los bajos índices obtenidos el año anterior en esta categoría, en este ejercicio se practicó destete precoz de los terneros. La evolución de peso y condición corporal de las vacas de primer cría se muestran en la figura 4.



Este manejo permitió un buen crecimiento de los terneros como fue mostrado anteriormente y obtener un 87,5% de preñez en el nuevo servicio y llegar al otoño con esta categoría, normalmente problemática, con muy buen peso y excelente condición corporal.

Vacas nuevas entoradas sin ternero


En el último entore, como consecuencia del bajo comportamiento reproductivo de las vacas de primer y segunda cría, se retuvo un lote de vientres nuevos para ser entorados nuevamente. Esta categoría que se entora sin ternero al pie no presenta mayores dificultades como puede observarse en la figura 5.



Vacas de cría

Los resultados obtenidos con las vacas de cría multíparas se muestran en la figura 6.

El peso y condición corporal logrados por esta categoría al inicio del entore y la evolución positiva durante el mismo, permitieron un destete convencional y la obtención de un buen porcentaje de preñez, compatible con las metas buscadas en esta categoría.





Conclusiones

En este ejercicio se han ido solucionando gran parte de los problemas surgidos en años previos como resultado de la aplicación de un paquete forrajero de menor costo.

En esta situación forrajera en que se maneja el rodeo, la aplicación del destete precoz a los terneros de las vacas de primer cría aparece como de fundamental importancia para el logro de los objetivos productivos planteados.

Manteniendo la política de tener pasturas de bajo costo, debe estudiarse la inclusión de una pequeña área más intensiva, que brinde forraje seguro en el período invernal, para ser utilizada estratégicamente en alguna de las categorías del rodeo, considerando las nuevas relaciones de precios.