



Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
URUGUAY



Manejo del Rodeo de Cría

Destete temporario con tablilla nasal

CARTILLA
Nº3



El periodo desde el parto al primer celo posparto se denomina anestro posparto.

La duración del mismo afecta las probabilidades de preñez de una vaca dentro del periodo de servicio.

La duración del anestro posparto está afectada principalmente por la nutrición y el amamantamiento.

Se han desarrollado varias técnicas que intentan disminuir la duración del anestro posparto a través de la disminución y/o eliminación del efecto inhibitorio que produce el amamantamiento sobre la ovulación.

El **Destete temporario con tablilla nasal** es una de ellas, siendo una técnica sencilla, fácil de utilizar en condiciones extensivas, de bajo costo y cuando se utiliza de forma correcta, logra un alto impacto en la mejora de los índices de preñez.



Manejo del Rodeo de Cría

Destete temporario con tablilla nasal



Algunas pautas generales a la hora de realizar un destete temporario con tablilla nasal

- Se debe colocar en terneros hijos de vacas en moderada condición corporal (no es una técnica recomendada en vacas en mal estado corporal, por ejemplo por debajo de 3 unidades de condición, escala 1 al 8).
- Es una técnica que también tiene impacto cuando las vacas están ganando peso y condición corporal desde el parto hacia el entore.
- En aquellos predios donde se realiza Diagnóstico de Actividad Ovárica, es una técnica que puede aplicarse en vacas en “anestro superficial”.
- Los terneros deberán tener al menos 60 días de edad cuando se les coloca la tablilla nasal.
- El periodo con la tablilla nasal puede ser de 11 a 14 días.
- Se recomienda colocar la tablilla al menos entre 30 y 40 días antes de finalizar el entore.
- Durante el periodo de uso de la tablilla el ternero no requiere ninguna atención especial y se mantendrá con su madre.
- La mayor caída de tablillas se da en las mangas, se recomienda ir largando al campo el ganado una vez colocada la tablilla nasal.
- Pueden existir pérdidas de tablillas en el campo, por lo que se recomienda recorrer el rodeo y reponer.
- La ubre no se seca en ese periodo y en general no se presentan problemas de mastitis.
- A medida que transcurre el tiempo con la tablilla nasal, los terneros dedican más horas al pastoreo y otras actividades.
- Una vez retirada la tablilla nasal, los terneros reinician la lactación.

Resultados posibles

- Los incrementos en la tasa de preñez pueden situarse, dependiendo de varios factores, entre 10 y 30 puntos porcentuales.
- El destete temporario también adelanta la aparición de celo adelantando de esa forma la preñez en el rodeo.
- Al destete definitivo (otoño) los terneros que usaron tablilla nasal presentarán similar peso o peso inferior a aquellos terneros que no la usaron (en algunos casos pueden presentar entre 6 y 8% menos de peso vivo al otoño).



Consulte a su técnico asesor