DIAGNOSTICO DEL CULTIVO DE BONIATO EN URUGUAY: REGIONES SUR Y NORESTE DEL PAIS.- I. Andreoni*, H. González*, J. Rodriguez, E. Straconi** y F. Vilaro*** (* Facultad de Agronomía, ** Plan Granjero, *** Estación Experimental Las Brujas, INIA).

En otoño de 1989 se hizo un diagnóstico del cultivo del boniato en Canelones, S. José, Tacuarembó y Rivera. Se entrevistaron consumidores, intermediarios, industrialesy 53 productores. Los objetivos fueron identificar factores limitantes del desarrollo del cultivo para orientar acciones en generación y transferencia de tencología, así como evaluar una metodología rápida de diagnóstico. El CIP apoyó este trabajo.
Las principales conclusiones son: Cada región tiene preferencia por tipos de boniato diferentes. Hay un escaso número de poblaciones locales y variedades. Existen requerimientos de nuevas variedades más precoces, resistentes a enfermedades y plagas y con aptitud a distintos usos y manejo. Se constataron limitaciones importantes del material de propagación en disponibilidad y calidad genética-sanitaria. Los principales problemas sanitarios de origen fúngico en el sur y virósico en el noreste, están asociados a esta situación. En las prácticas de manejo predomina el empirismo, especialmente en fertilización y rotación, y un objetivo es minimizar costos. la poca mecanización y la escasez de mano de obra, ésta especialmente en el sur, condiciona el manejo y el área sembrada por productor. La conservación del producto tiene gran importancia, en especial en el sur. Las pérdidas por este concepto son apreciables, el cv. Morada INTA es el de mejor comportamiento. Como fuente de ingreso a lo largo del año es más importante en el autoconsumo del predio, familiar y de animales. Hay varios canales de comercialización, con un papel considerable de laintermediación, en especial en el sur. Se realizan recomendaciones respecto al desarrollo de líneas de investigación y difusión del conocimiento actualmente disponible.