



SISTEMA
GANADERO
EXTENSIVO

¿Por qué estas etapas son importantes?

Porque tienen incidencia en varios factores productivos y reproductivos en la vida del animal, tales como:

- mortandad post destete
- producción y calidad de lana
- performance reproductiva de la borrega
- edad de faena y alcanzar los pesos objetivos
- vida adulta
- madre, puede condicionar la próxima encarnera


¿Cuándo realizarlo?

A las 12 semanas de edad, la leche provee solamente entre el 5 y el 10% de la dieta necesaria para el cordero; la pastura provee el resto, el cordero sigue a su madre y pastorea donde ella pastorea. Por consiguiente, la oveja come la mejor calidad de la pastura y el cordero debe hacerlo con la segunda mejor calidad mientras pastoree junto a su madre. Por lo tanto, a partir de las 12 semanas de edad, la dieta consumida por un cordero no destetado es la segunda mejor parte de la pastura.

Al separar el cordero de la oveja, este puede pastorear la mejor parte de la pastura. Agregado a esto, si fue destetado sobre un potrero seguro, pueden esperarse mayores tasas de crecimiento y producción de lana que si pastorea junto con su madre.

En la práctica, los corderos son mejor destetados 13 semanas luego de que comience la parición. Esto determina que la mayoría de ellos tienen aproximadamente 12 semanas de edad y más jóvenes, ocho semanas, cuando la leche aporta entre el 15 y 12% del consumo total.





**SISTEMA
GANADERO
EXTENSIVO**



Algunas ventajas de destetar temprano

- Los corderos destetados temprano producen 0,500 kg de lana sucia como borregos.
- Las ovejas a las que se les destetó temprano los corderos dieron 0,100 kg más de lana sucia.

Características deseables para un buen potrero de destete

- Pastoreado con vacunos o en su defecto con categorías ovinas solteras durante los últimos tres meses, para tenerlo lo más descontaminado de parásitos gastrointestinales posible
- Alturas de pasto entre 5 y 10 cm de altura y mínimo 55% de relación verde seco
- Disponibilidad de agua de calidad y sombra

Sanidad previa

- Libre de pietín
- Clostridiosis: dos dosis previo al destete
- Vacuna contra ectima
- Dosificación previa, importante, saber qué tomas dan resultado en el establecimiento

Peso vivo objetivo al destete

Peso vivo adulto (kg)	Al destete 45% del peso vivo adulto (kg)	A otoño 50% del peso vivo adulto (kg)	A fin de invierno 60% del peso vivo adulto (kg)	A la encarnerada 80% del peso vivo adulto (kg)
50	22,5	25	30	40
55	24,8	27,5	33	44
60	27	30	36	48
70	31,5	35	42	56



**SISTEMA
GANADERO
EXTENSIVO**

Justificación

Si los borregos no alcanzan el peso mínimo, no van a tener reservas grasas suficientes para mantener el peso corporal en el momento en que pasen por períodos críticos, como por ejemplo, alimentarse con pasturas de baja calidad en el verano, como consecuencia podemos tener problemas con la mortandad post destete.

Mortandad post destete


La mortandad post destete se da en los primeros meses luego de destetados. La tasa de riesgo de mortandad está afectada por:

- peso vivo al destete: menor tasa de riesgo por encima de 22 kg
- ganancia de peso (GP) post destete: disminuye la tasa de riesgo con ganancias de 0,5 kg/día a más
- sus combinaciones
 - Buen PV, mala GP alto riesgo
 - Bajo PV, alta GP, baja el riesgo

Es aconsejable lotear los animales por debajo de 22 kg y ponerlos en planos de alimentación que les permitan buenas ganancias de peso para llegar a los pesos objetivo

Tecnologías disponibles para mejorar ganancias de peso

Tecnologías	Corderos por ha	Ganancia kg/día
Campo Natural	5 – 7	0,05
Campo Natural + suplemento proteícos	8 – 12	0,08 – 0,130
Pastoreo horario pasturas de alta calidad	20 – 70	0,06 – 0,09
Mejoramientos y praderas de alta calidad	10 – 20	0,1 – 0,2
Pastoreo en cultivos anuales	30 – 50	0,07 – 0,155
Confinamiento		0,200 – 0,300



SISTEMA GANADERO EXTENSIVO

¿Vale la pena preocuparse por lograr buenos PV al destete y ganancias post destete?

Algunos ejemplos

- A mayores PV al destete, mayores porcentajes de parición y señalada
- Corderos a campo natural suplementados con raciones ricas en proteína
 - 40% más de producción de lana en período estival
 - 15 a 23% de aumento de producción a su primer vellón
- Corderos a campo natural suplementados con raciones ricas en proteína
 - Mayor peso a igual edad, 39 vs. 46

El destete y la recría tienen efectos directos sobre la productividad de por vida del animal

