

LEPIDÓPTEROS PLAGA EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

CARTILLA
N° 68

Fuente: Guía para el manejo integrado de plagas y enfermedades en frutales.
Boletín de Divulgación N° 66, INIA

INIA
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
URUGUAY



Cydia pomonella (1), *Grapholita molesta* (2), *Bonagota salubricola* (3), *Argyrotaenia spheropera* (4)

Nombre científico	Nombre común	Hospedero
<i>Cydia pomonella</i>	Gusano de las peras y manzanas Carpocapsa Codling moth	Manzano, peral, membrillero y nogal
<i>Grapholita molesta</i>	Polilla del duraznero y membrillero Gusano del duraznero y el membrillero Oriental fruit moth	Membrillero, duraznero, manzano, ciruelo, peral, damasco, cerezo y almedro
<i>Bonagota salubricola</i>	Lagartita de los frutales Lagartita de dos bandas Leaf roller	Ceibo, ciruelo, cítricos, duraznero, ligustrino, ligustro, madreSelva, manzano, peral, rosál y vid
<i>Argyrotaenia spheropera</i>	Lagartita de los racimos Leaf roller	Ceibo, ciruelo, cítrico duraznero, jazmín, ligustrino, ligustro, madreSelva, manzano, peral, pimientó, rosál y vid

Sugerencias de monitoreo para lagartitas

- A principio de la temporada de monitoreo prestar atención a los brotes, especialmente en manzanas del grupo Gala.
- Prestar atención a zonas de contacto entre frutos o entre frutos y hojas.
- Revisar los ramilletes de frutas.

Sugerencias de monitoreo para grafolita

- En manzanos, a partir de fines de diciembre observar daños en brotes y a partir de fines de enero daños en frutas.
- Cortar frutas para observar mejor el daño y poder discriminarlo del de carpocapsa.
- **Importante: trampas de feromonas no sirven en montes con confusión sexual.**

Sugerencias de monitoreo para carpocapsa

- Cortar frutas para observar mejor el daño y poder discriminarlo del de carpocapsa.
- **Importante: en montes con confusión sexual usar trampas 10X.**

Periodos de presencia de lepidópteros plaga a lo largo del año

Fenología	Floración						Desarrollo de la fruta						Cosecha			
	Invierno	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Otoño							
Durazno																
Peral																
Manzano																
Plaga	Invierno	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Otoño							
Carpocapsa <i>Cydia pomonella</i>																
Grafolita <i>Grapholita molesta</i>																
Lagarittas <i>Bonagota salubricola</i> <i>Argyrotaenia sphaeropa</i>																

Período crítico

Período probable